NOTE XXIV.

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE PHYLLOGNATHUS

(COLEOPTERA: SCARABAEIDAE)

PAR

L. FAIRMAIRE.

Phyllognathus prostomis, n. sp.

Long. 14 mill. — Oblongus, subparallelus, convexus, castaneus, nitidus; capite brevi, rugoso, antice obtuse lobato, utrinque angulato, mandibulis prominulis, valde bilobatis; prothorace transverso, elytris haud angustiore, antice angustato, lateribus sat rotundatis, dorso parum fortiter sat dense punctato, plagula media lævi, antice abbreviata signato, basi et antice subtiliter marginato, angulis posticis rotundatis; scutello lato, brevi, semilunari, lævi; elytris basi medio sat fortiter sinuatis, ad humeros sat angulatis, medio vix ampliatis, sutura paulo elevata, utrinque seriebus 3 geminatis, punctulatis, intervallis sat laxe punctatis, lateribus fortius ac densius subseriatim punctatis, stria suturali apice profundiore; pygidio subtiliter densissime ruguloso-punctato; subtus cum pedibus dilutior, pectore villoso, tibiis anticis valde tridentatis.

Hab. Bloemfontein: Afrique mérid. (van Olden). — Musée de Leyde.

Cet insecte diffère du *Phyllognathus corydon* par la forme étroite, ses mandibules profondément bilobées, très saillantes, ses tarses et ses antennes plus grèles. C'est une acquisition assez intéressante pour le groupe peu nombreux des *Phyllognathus* inermes.

Paris, Octobre 1897.